

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 15-6-82995634

✓ BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42

ABONNEMENT ANNUEL 85 F

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-57

N° 11 - 10 JUIN 1982

/ V I G N E /

OIDIUM :

L'extension de la maladie a été favorisée par les conditions climatiques de la dernière décade, en particulier dans les vignes non traitées ou mal suivies.

Au cours de la floraison la lutte est effectuée :

- par soufrage de préférence,
- ou par pulvérisation d'une spécialité à base de :
soufre micronisé mouillable, de triadiméfon, de fénarimol ou de triforine.

L'application doit être réalisée avec soin, en veillant à bien enrober les jeunes grappes.

MILDIU :

La période fortement perturbée de la semaine dernière n'a provoqué qu'une pluviométrie peu importante en Languedoc-Roussillon : quelques millimètres à 14 ou 17 dans certains secteurs en 3 jours.

A la suite de ces conditions, le mildiou ne s'est manifesté que très localement, sous forme de foyers, il y a quelques jours, à Estagel (66), Pépieux et Pézenas (34) et dans deux situations du Gard. Les contaminations ont eu lieu à la faveur de pluies locales.

Aussi en cette période de l'année et en l'absence d'orages, il suffit de traiter les parcelles dans lesquelles la maladie s'est manifestée.

BOTRYTIS :

Le botrytis a connu une période favorable à son apparition dans le vignoble. Des taches sont observées sur feuillage. Une prochaine note précisera la conduite à tenir.

7 424

/ ARBORICULTURE FRUITIERE /

- Dans tous les cas respectez strictement les délais d'emploi des produits avant récolte -

LUTTE CONTRE LES OÏDIUMS :

Elle doit être poursuivie avec rigueur sur pêchers, abricotiers et pommiers.

Sur les variétés précoces d'abricotiers et de pêchers, on évitera l'emploi de produits "marquants".

PUCERONS :

La lutte est à maintenir compte tenu leur très forte recrudescence.

TORDEUSE ORIENTALE ET CARPOCAPSE :

La forte activité de ces ravageurs nécessite un renouvellement de la protection.

CYLINDROSPORIOSE ET GNOMONIA DU CERISIER :

Dans les ceriseraies attaquées par cette maladie, appliquer après récolte, un des fongicides suivants :

- *bénomyl, carbendazime, dithianon, doguadine, folpel, manèbe, méthylthiophanate, oxyquinoléate de cuivre,*

- *bénomyl, captane et méthylthiophanate* sont également efficaces contre le *Gnomonia*.

/ M A Î S /

SESAMIE :

Les vols de 1ère génération ont débuté autour du 10 mai. Ils devraient se poursuivre au delà de la mi-juin. Les premières attaques de chenilles sont visibles, par foyers, et ont été décelées au cours de la semaine écoulée.

Les producteurs de maïs-semence, dont les cultures ont souffert de fortes attaques de ce ravageur l'an dernier, peuvent dès à présent envisager une intervention.

/ M E L O N /

OIDIUM :

Une première intervention est recommandée de suite.

Tirage du 10 juin 1982 - 1100 exemplaires

© Bulletin Technique des Avertissements Agricoles - Montpellier 1982